343027

Well Name _____ Basin _____ Sheet No. 2 of 6

| SAMPLE TYPE * | S | S | C | S | S | S | S | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPTHS / PALYNOMORPHS | 9650 | 9680 | 9752 | 9900 | 9950 | 10,038 | 10,084 | 10,294 | 10,556 | 10,770 |
| A. qualumis | | | | | | | | | | |
| A. acutullus | | | | | | | | | | |
| A. luteoides | | | | | | | | | | |
| A. oculatus | | | | | | | | | | |
| A. sectus | | | | | | | | | | |
| A. triplaxis | | | | | | | | | | |
| A. obscurus | | | | | | | | | | |
| B. disconformis | | | / | | | | | | | |
| B. arcuatus | | | | | | | | | | |
| B. elongatus | | | | | | | | | | |
| B. mutabilis | | | | | | | | | | |
| B. otwayensis | | | | | | | | | | |
| B. elegansiformis | | | | | | | | | | |
| B. trigonalis | | | | | | | | | | |
| B. verrucosus | | | | | | | | | | |
| B. bombaxoides | | | | | | | | | | |
| B. emaciatus | | | | | | | | | | |
| C. bullatus | | | | | | | | | | |
| C. heskermensis | | | | | | | | | | |
| C. horrendus | | | | | | | | | | |
| C. meleosus | | | | | | | | | | |
| C. apiculatus | | | | | | | | | | |
| C. leptos | | | | | | | | | | |
| C. striatus | | | | | | | | | | |
| C. vanraadshooveni | | | | | | | | | | |
| C. orthoteichus/major | | | | | | | | | | |
| C. annulatus | | | | | | | | | | |
| C. gigantis | | | ? | | | | | | | |
| C. splendens | | / | / | | / | | | / | / | |
| D. australiensis | | | | | | | | | | |
| D. granulatus | / | / | / | | / | | / | / | / | |
| D. tuberculatus | | | | | | | | | | |
| D. delicatus | | | | | | | | | | |
| D. semilunatus | | | | | | | | | | |
| E. notensis | | | | | | | | | | |
| E. crassiexinus | | | | | | | | | | |
| F. balteus | | | | | | | | | | |
| F. crater | | | | | | | | | | |
| F. lucunosus | | | | | | | | | | |
| F. palaequetrus | | | | | | | | | | |
| G. edwardsii | | | | | | | | | | |
| G. rudata | | | | | | | | | | |
| G. divericatus | | | | | | | | | | |
| G. gestus | | | | | | | | | | |
| G. catathus | | | | | | | | | | |
| G. cranwellae | | | | | | | | | | |
| G. wahooensis | | | | | | | | | | |
| G. bassensis | | | | | | | | | | |
| G. nebulosus | | | | | | | | | | |
| H. harrisii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| H. astrus | | | | | | | | | | |
| H. elliottii | | | | | | | | | | |
| I. anguloclavatus | | | | | | | | | | |
| I. antipodus | | | | | | | | | | |
| I. notabilis | | / | / | | | | | | | |
| I. gremius | | | | | | | | | | |
| I. irregularis | | | | | | | | | | |
| J. peiratus | | | | | | | | | | |
| K. waterbolkii | | | | | | | | | | |
| L. amplus | | | | | | | | | | |
| L. crassus | | | | | | | | | | |
| L. ohaiensis | | | | | | | | | | |
| L. bainii | | | | | | | | | | |
| L. lanceolatus | | | | | | | | | | |
| L. balmei | | | | | | | | | | |
| L. florinii | | | | | | | | / | | |
| M. diversus | / | / | / | | | / | / | | / | |
| M. duratus | | | | | | | | | | |
| M. grandis | | | | | | | | | | |
| M. perimagnus | | | | | | | | | | |

*C = core; S = sidewall core; T = cuttings.